

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
1	COMBINATIONS (複方:DIPHENYLPYRALINE HCL + SALICYLIC ACID + TOLNAFTATE)	軟膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如：足癬（香港腳）、股癬、汗斑、暫時緩解皮膚搔癢	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:刪除, 未說明理由。 2. 台灣醫學會:刪除, 未說明理由	1	1	刪除
2	OPIUM ALKALOIDS AND DERIVATIVES (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + DEXTROMETHORPHAN HBR + PHENYLEPHRINE HCL + TERPIN HYDRATE)	錠劑	鎮咳(感冒、支氣管炎、氣喘、過敏而引起之咳嗽)	台灣醫學會:刪除, 未說明理由	0	0	刪除
3	PHENYLPROPANOLAMINE, COMBINATIONS (複方:BROMPHENIRAMINE MALEATE + CAFFEINE ANHYDROUS + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	膜衣錠	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	台灣醫學會:刪除, 未說明理由	0	0	刪除
4	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀(鼻塞、咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除, 無說明理由。 2. 台灣醫學會:刪除, 未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議	3	3	刪除
5	PHENYLPROPANOLAMINE, COMBINATIONS (複方:BELLADONNA TOTAL ALKALOIDS + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	膠囊劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1. 台灣醫學會:刪除, 未說明理由 2. 台灣內科醫學會:未表示意見	1	1	刪除
6	DIPROPHYLLINE, COMBINATIONS (複方:DIMENHYDRINATE + DIPROPHYLLINE + PYRIDOXINE HCL + SCOPOLAMINE HBR)	錠劑	暈動病(噁心、暈眩、頭痛)噁心、嘔吐之預防及治療	1. 台灣外科醫學會:刪除, 未說明原因 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	17	27	刪除 (各學會意見刪除、其他或未表示意見, 故建議刪除)
7	LIVER THERAPY (複方:NIACINAMIDE (=NICOTINAMIDE) + PANTOTHENATE CALCIUM + PYRIDOXINE HCL + RIBOFLAVIN (=VIT B2) + SILYMARIN + THIAMINE HCL (=THIAMINE CHLORIDE HYDROCHLORIDE))	膠囊劑	慢性肝病的營養補給	1. 中華民國骨科醫學會:刪除, 無說明理由 2. 臺灣兒科醫學會:刪除, 無說明理由。 3. 台灣醫學會:刪除, 未說明理由 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	85	133	刪除 (各學會意見刪除、其他或未表示意見, 故建議刪除)
8	PHENYLPROPANOLAMINE, COMBINATIONS (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + METHYLEPHEDRINE HCL)	膠囊劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除, 無說明理由。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	74	113	刪除 (各學會意見刪除、其他或未表示意見, 故建議刪除)

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
9	ACETYLSALICYLIC ACID	栓劑	退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)、化熱栓劑	1.台灣醫學會:未表示意見 2.台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見	0	0	刪除
10	BUCLIZINE, COMBINATIONS (複方:BUCLIZINE 2HCL + NIACIN (=NICOTINIC ACID))	錠劑	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹、預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀、畢可洛敏錠	1.台灣醫學會:未表示意見 2.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 3.台灣內科醫學會:未表示意見	2	3	刪除
11	CYCLIZINE (複方:CYCLIZINE HCL)	錠劑	預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀	1.台灣醫學會:未表示意見 2.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	1	3	刪除
12	FLUTICASONE	鼻用噴液懸浮劑	過敏性鼻	1.台灣醫學會:未表示意見 2.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	0	0	刪除
13	GINKGO FOLIUM	糖衣錠	末梢血行障礙之輔助治療	1.台灣醫學會:未表示意見 2.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	1	1	刪除
14	ORGANO-HEPARINOID	乳膏劑	鈍物創傷後之血腫、淺層性靜脈炎之局部治療	1.台灣復健醫學會:其他,無說明理由 2.台灣醫學會:未表示意見 3.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	1	1	刪除
15	PARACETAMOL, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + BROMISOVALUM (=BROMVALERYLUREA) (=BROMVALETONE) + CAFFEINE ANHYDROUS + ETHENZAMIDE (=ETHOXYBENZAMIDE))	錠劑	退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)	1.台灣醫學會:未表示意見 2.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 3.台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見	1	1	刪除
16	VALETHAMATE	錠劑	抑制胃腸管之痙攣及運動機能亢進:(賁門、幽門及食道等之痙攣、腸疝痛、痙攣性便秘)、抑制膽管之痙攣及運動障礙:(膽囊炎、膽管炎)、抑制尿路之痙攣:(膀胱痛、器具插入後之尿管及膀胱痙攣、手術後之痙攣性後遺症)、抑制女性生殖器之痙攣性狀態:(痙攣性月經困難症、分娩時之子宮下部痙攣)	1.台灣醫學會:未表示意見 2.台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 3.台灣內科醫學會:未表示意見	3	4	刪除

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
17	BENZOYL PEROXIDE, COMBINATIONS (複方: BENZOYL PEROXIDE + CETYL ALCOHOL (=CETANOL)(=ALCOHOL CETYLICUS) + LIQUID PARAFFIN (=LIQUID PETROLATUM=MINERAL OIL))	乳膏劑	治療尋常性座瘡	台灣醫學會:未表示意見	0	0	刪除
18	CARBOCISTEINE	內服顆粒劑	祛痰	台灣醫學會:未表示意見	0	0	刪除
19	CARBOCISTEINE	發泡顆粒劑	祛痰	台灣醫學會:未表示意見	0	0	刪除
20	CHLORCYCLIZINE	糖衣錠	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	台灣醫學會:未表示意見	0	0	刪除
21	CLOTRIMAZOLE	陰道錠	由黴菌(多數念珠球菌毛滴蟲屬)所引起之白帶、陰道炎	台灣醫學會:未表示意見	0	0	刪除
22	GINKGO FOLIUM	錠劑	末梢血行障礙之輔助治療	1. 台灣醫學會:未表示意見 2. 台灣內科醫學會:未表示意見	1	1	刪除
23	ISPAGHULA (PSYLLA SEEDS)	粉劑	軟便	1. 台灣醫學會:未表示意見 2. 台灣內科醫學會:未表示意見	1	1	刪除
24	LOPERAMIDE	錠劑	暫時緩解輕微或中度急性腹瀉	1. 台灣醫學會:未表示意見 2. 台灣內科醫學會:未表示意見	1	1	刪除
25	MAFENIDE (複方: ALLANTOIN + MAFENIDE (=HOMOSULFAMINE))	軟膏劑	急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染	台灣醫學會:未表示意見	0	0	刪除
26	MICONAZOLE	軟膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如:足癬(香港腳)、股癬、汗斑	台灣醫學會:未表示意見	0	0	刪除
27	NAPHAZOLINE, COMBINATIONS (複方: CHONDROITIN SULFATE SODIUM + NAPHAZOLINE HCL + TAURINE + VITAMIN A)	點眼液劑	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅、眼睛疲勞	台灣醫學會:未表示意見	0	0	刪除

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
28	ALGINIC ACID (複方:ALGINIC ACID + ALUMINUM HYDROXIDE DRIED GEL + MAGNESIUM CARBONATE LIGHT)	咀嚼錠	逆流性食道炎、裂孔赫尼亞、胃灼熱、胃及十二指腸潰瘍、胃酸過多、艾胃逆服咀嚼錠	<p>1. 台灣消化系醫學會:保留， (1)此藥物是由藻膠酸萃取而成，為天然多醣聚合物，飯後服用能與胃酸接觸數分鐘內形成高pH值的泡沫保護層，防止胃酸逆流至胃食道黏膜。是目前胃食道逆流治療藥物中唯一非化學合成的天然萃取產品。不經人體吸收，對於孕婦更是唯一可適用之安全有效產品。 (2)與目前治療胃食道逆流常用之質子幫浦阻斷劑(PPI)作用機制不同，具有相輔相成效果，且無長期PPI使用之副作用及安全考量。 (3)醫學文獻證明對治療胃食道逆流有效，對非典型之胃食道逆流症狀(亦稱為咽喉逆流laryngopharyngeal reflux, LPR)亦被證明有效，納入治療指引。 Diseases of the Esophagus, 2017; 30: 1 - 9 Otolaryngology - Head and Neck Surgery 2019, Jan, 1 - 21 Laryngoscope. 2018 Oct;128(10):2252-2260.(臺大醫院研究) (4)臨床使用量大，安全有效。考量日益增多的胃食道逆流患者之治療權益，建議保留為健保品項。</p> <p>2. 中華民國心臟學會:保留，逆流性食道炎引起胸痛之常用藥物</p> <p>3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留，目前用於治療預防胃食道逆流的產品「艾胃逆服」為藻膠酸萃取而成，為天然多醣聚合物，在與胃酸接觸數分鐘內沉澱成pH值接近中性之低密度粘性凝膠，形成高pH值的泡沫保護層，防止胃酸逆流至胃食道黏膜，效果良好。惟Alginic acid 常與鎂、鋁離子制酸劑併成複方製劑，長期不當服用恐影響腎功能及腦病變，宜在醫師審慎評估處方下使用。</p> <p>4. 台灣醫學會:保留，臨床有其用處</p>	620	11560	保留
29	BENZOCAINE (複方:BISMUTH SUBNITRATE (=BISMUTH NITRATE BASIC) + CHLORHEXIDINE ACETATE + ETHYL AMINOBENZOATE (=BENZOCAINE) + GLYCYRRHETIC ACID (=ENOXOLONE)(=GLYCYRRHETINIC + LIDOCAINE + PHENYLEPHRINE HCL)	栓劑	內痔、外痔、痔出血、肛門周圍炎、肛門裂傷千痔康栓劑	<p>1. 台灣消化系醫學會:保留，主要作為痔瘡患者緩解症狀使用，痔瘡患者相當多，臨床使用量大，安全有效。建議參酌的使用量大之大腸直腸外科醫學會意見。</p> <p>2. 台灣外科醫學會:保留，痔瘡用藥</p> <p>3. 台灣醫學會:保留，臨床有用</p> <p>4. 中華民國大腸直腸外科醫學會:保留，本學會建議全數保留，此類藥物皆為直外門診常用藥物，且需經專科醫師評估過後才能依實際病症開立使用。為維護病患權益及避免病患自行購買不適當的藥物塗抹而延誤病情，加上栓劑和藥膏皆有其使用之方便性，故建議此類藥物全數保留。</p>	40	721	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
30	BETAMETHASONE	乳膏劑	濕疹或皮膚炎臨得隆乳膏	1. 台灣婦產科醫學會:保留, 臨床確實有需要 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Betamethasone 乳膏屬於類固醇藥膏, 對於健保病患常見的濕疹、乾癬、接觸性皮膚炎等皮膚發炎患者有顯著的療效。 在臨床使用中, 類固醇藥膏有不同效價, 差異可達1000倍, 不同的效價相對也會產生不同強度的副作用, 臨床醫師根據病患需求常需要不同效價強度的藥膏來進行控制, 因此需提供多樣選擇能提升治療效果, 建議保留。 3. 台灣醫學會:未表示意見	201	7052	保留
31	CHONDROITIN (複方:CHONDROITIN SULFATE + FLAVINEADENINE DINUCLEOTIDE SODIUM)	點眼液劑	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適或眼睛紅	1. 台灣醫學會:未表示意見 2. 中華民國眼科醫學會:保留, 未表示意見	4	4	保留
32	DIPHENHYDRAMINE, COMBINATIONS (複方:CAFFEINE ANHYDROUS + DIMENHYDRINATE + PYRIDOXINE HCL)	膠囊劑	預防或緩解暈車、暈船、暈機所引起頭暈、噁心、嘔吐、頭痛	1. 台灣婦產科醫學會:保留, 臨床確實有需要 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 有些人使用抗組織胺, 例如:懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓, 以及心、肝、腎功能不佳的人, 務必經過醫師或藥師的指示再使用, 以免造成健康風險。此外, 哺乳婦女若服用抗組織胺, 可能會有少量存在於乳汁中, 因此不建議哺乳婦女使用。 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	6	10	保留
33	LEVODROPROPIZINE	糖衣錠	鎮咳、祛痰(乾咳、氣腫或胸膜刺激所引起之咳嗽、痙攣性咳嗽、呼吸道刺激、鼻咽炎、喉炎、支氣管炎、肺炎、感冒等引起之咳嗽)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 此藥之不良反應表現在腸胃方面有噁心、胃灼燒、消化不良、腹瀉等。中樞神經方面乏力、嗜睡、頭疼、昏眩等。心血管方面有心悸。偶有皮疹。宜經醫師審慎評估下使用。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣外科醫學會:保留, 鎮咳化痰藥 4. 台灣醫學會:未表示意見	5	6	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
34	MOMETASONE	鼻用噴液劑	成人青少年及二歲以上兒童之季節性或常年性過敏性鼻炎、亦用於治療18歲及以上成人輕度到中度鼻息肉之相關症狀	1. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留, 咳痰症狀的治療需考量病人整體病情, 經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量, 以達到緩解症狀並避免潛在副作用, 這些藥物非僅是緩解症狀, 也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付, 單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買, 有可能病人症狀未獲緩解, 或產生新問題反覆就醫, 徒增醫療支出。 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 此藥是類固醇的鼻噴劑, 用來治療過敏性鼻炎, 但病人的症狀是感染或過敏性鼻炎, 宜在醫師正確診斷下使用。 3. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 4. 台灣醫學會:未表示意見	1094	6779	保留
35	NAPHAZOLINE (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + NAPHAZOLINE HCL)	鼻用噴液劑	鼻塞、鼻充血、鼻竇炎、過敏性鼻炎	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 宜在醫師的指示下使用, 否則易產生藥物性鼻炎。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	58	615	保留
36	NAPHAZOLINE	點眼液劑	暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅	1. 台灣醫學會:未表示意見 2. 中華民國眼科醫學會:保留, 未表示意見	1	1	保留
37	SENNA GLYCOSIDES	膜衣錠	緩解便秘	1. 台灣消化系醫學會:保留, 1. 慢性便秘患者相當多, 臨床使用量大, 安全有效。2. 醫學文獻證明對治療慢性便秘有效。Am J Gastroenterol 2021;116:152-161 2. 台灣神經學學會:保留, 無說明理由 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	2687	21344	保留
38	TRIAMCINOLONE	口腔錠	短期緩解急慢性口腔黏膜破損	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 不當使用類固醇可能導致一些副作用, 例如可能發生: 食慾增加、體重增加、水牛肩、月亮臉、白內障、青光眼、消化不良、骨質疏鬆、高血壓、糖尿病、皮膚問題、肌肉無力、增加感染風險等。這些副作用往往是在長期使用和未經監測的情況下出現的。所以必須在醫師仔細評估下審慎使用。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見	2	2	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
39	ZINC PRODUCTS (複方:ZINC OXIDE)	軟膏劑	緩解皮膚刺激及尿布疹	<p>1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Zinc 軟膏具有抗炎和保護作用, 適用於尿布疹、小燙傷和皮膚刺激等情況, 有助於減輕紅腫並促進皮膚癒合。此藥物能在皮膚上形成保護屏障, 減少進一步刺激, 特別適合敏感皮膚及兒童使用, 針對臥床、老人等悶熱潮濕引起的早期紅斑、紅臀可提供長期的皮膚保護, 降低更昂貴治療的需求。</p> <p>2. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留, 慢性臥床病人照護經常需要開立, 但須評估傷口, 建議仍須醫師診療來開立。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性</p> <p>4. 台灣醫學會:未表示意見</p>	401	11054	保留
40	ACETYLCYSTEINE	內服顆粒劑	減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性	<p>1. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留, 咳痰症狀的治療需考量病人整體病情, 經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量, 以達到緩解症狀並避免潛在副作用, 這些藥物不僅是緩解症狀, 也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付, 單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買, 有可能病人症狀未獲緩解, 或產生新問題反覆就醫, 徒增醫療支出。</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 使用此藥可能有噁心、嘔吐、食慾不振、+E3:E91輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感、偶有發疹等過敏症狀, 宜在醫師詳細評估下使用。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性</p> <p>4. 台灣醫學會:保留, 臨床仍有需要</p> <p>5. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p>	2427	18213	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
41	ACETYLCYSTEINE	膠囊劑	減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性	<p>1. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留, 咳痰症狀的治療需考量病人整體病情, 經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量, 以達到緩解症狀並避免潛在副作用, 這些藥物不僅是緩解症狀, 也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付, 單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買, 有可能病人症狀未獲緩解, 或產生新問題反覆就醫, 徒增醫療支出。</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 使用此藥可能有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感、偶有發疹等過敏症狀, 宜在醫師詳細評估下使用。</p> <p>3. 台灣醫學會:保留, 臨床仍有需要</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>5. 台灣內科醫學會:保留, 緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物</p>	322	2597	保留
42	ACETYLCYSTEINE	錠劑	減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性	<p>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 使用此藥可能有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感、偶有發疹等過敏症狀, 宜在醫師詳細評估下使用。</p> <p>2. 台灣醫學會:保留, 臨床仍有需要</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>4. 台灣內科醫學會:保留, 緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物</p>	145	251	保留
43	ACETYLCYSTEINE	顆粒劑	減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性	<p>1. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留, 咳痰症狀的治療需考量病人整體病情, 經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量, 以達到緩解症狀並避免潛在副作用, 這些藥物不僅是緩解症狀, 也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付, 單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買, 有可能病人症狀未獲緩解, 或產生新問題反覆就醫, 徒增醫療支出。</p> <p>2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性</p> <p>3. 台灣醫學會:保留, 臨床仍有需要</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p>	35	210	保留
44	BISACODYL	腸溶錠	緩解便秘	<p>1. 中華民國骨科醫學會:保留, 無說明理由</p> <p>2. 台灣神經學學會:保留, 無說明理由</p> <p>3. 台灣醫學會:保留, 臨床常用</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p>	4	5	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
45	OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS (複方:GUAIACOL GLYCERYL ETHER (=GUAIFENESIN) + NOSCAPINE)	錠劑	鎮咳、祛痰	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣醫學會:保留,臨床常用藥物之一 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留,緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物 5. 台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀 可減少服用藥物類數	4	6	保留
46	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + SALICYLAMIDE)	膠囊劑	緩解感冒之各種症狀 (咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)	1. 台灣醫學會:保留,成分較單純,成本較低 2. 台灣精神醫學會:保留,指示用藥皆有醫師診治後適用的適應症,且費用不高,宜保留並開立予有需要的病患,避免因未有給付,使健保治療反而競逐較高價的同類健保給付之藥物。 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	6	7	保留
47	ACETYLSALICYLIC ACID	腸溶錠	退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)	1. 台灣外科醫學會:保留,退燒藥 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	4	4	保留
48	ACETYLSALICYLIC ACID	膜衣錠	退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)	1. 台灣神經學學會:保留,無說明理由 2. 中華民國心臟學會:保留,急性心肌梗塞緊急心導管前使用,仍有其角色,為了達到快速吸收,首次劑量應咀嚼服用。 3. 社團法人中華牙醫學會:其他,暫無建議。 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 7. 台灣內科醫學會:未表示意見	60	2649	保留
49	ACETYLSALICYLIC ACID	錠劑	退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)	1. 臺灣兒科醫學會:保留,此藥為阿司匹靈(aspirin),仍使用於兒童川崎氏症的治療,及兒童缺血性中風的治療選擇之一 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	22	93	保留
50	ACETYLSALICYLIC ACID, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS (複方:ASPIRIN + CAFFEINE)	錠劑	退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,不宜讓民眾直接至藥局購買,使用 aspirin用於水痘兒童退燒,恐造成雷伊氏症候群 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	4	4	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
51	BENZOYL PEROXIDE	外用凝膠劑	治療尋常性痤瘡	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Benzoyl peroxide 是治療尋常性痤瘡的一線藥物, 能有效減少發炎和抑制痤瘡細菌增長, 具有良好的安全性, 且依據國際治療指引, 使用benzoyl peroxide不會產生抗藥性菌種, 外用治療併用benzoyl peroxide和抗生素藥膏, 可以有效減少抗藥性菌種的產生, 在痤瘡的第一線治療有不可取代的角色。建議保留。 2. 臺灣兒科醫學會:其他, 請會皮膚科醫學會 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	629	3301	保留
52	BENZOYL PEROXIDE	乳膏劑	治療尋常性痤瘡	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, 乳膏劑型 Benzoyl peroxide 與凝膠劑同樣可用於治療痤瘡, 但劑型不同以適應不同患者需求。建議保留。 2. 台灣外科醫學會:保留, 痤瘡用藥 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議	142	344	保留
53	BETAMETHASONE (複方: BETAMETHASONE (VALERATE) + LIDOCAINE HCL + PHENYLEPHRINE HCL)	栓劑	外痔核、痔出血、痔疼痛、肛門裂創、肛門周圍炎、肛門搔癢症、肛門濕疹、肛門潰瘍痔淨能栓劑	1. 台灣外科醫學會:保留, 痔瘡用藥 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	11	20	保留
54	BETAMETHASONE AND ANTIBIOTICS (複方: BETAMETHASONE (DIPROPIONATE))	乳膏劑	皮膚癬、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、皮膚溢出性皮膚炎、神經性皮膚炎、剝落性皮膚炎、日晒皮膚炎	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Betamethasone 與抗生素的組合軟膏可同時減輕皮膚炎症並控制感染, 適用於感染性濕疹和皮膚炎等同時伴隨細菌感染的情況。上述合併濕疹及細菌感染的狀況相當常見, 若能適時給予相關治療, 可以降低更嚴重感染的風險並減少後續的醫療耗用, 是臨床上重要的雙重治療選擇。 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 抗生素或類固醇皮膚藥膏, 皆宜在醫師正確診斷後開立使用。 3. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 4. 台灣外科醫學會:保留, 皮膚炎及癬用藥 5. 台灣醫學會:未表示意見 6. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 7. 台灣內科醫學會:未表示意見	669	4370	保留
55	BETAMETHASONE AND ANTIBIOTICS (複方: BETAMETHASONE (VALERATE) + NEOMYCIN (SULFATE))	軟膏劑	濕疹及類似疾患、火傷、濕疹性外耳道炎、耳殼周圍炎、耳殼皮膚炎、手術創傷、進行性壞疽性鼻炎、鼻前庭及周圍炎	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Betamethasone 與抗生素的組合軟膏可同時減輕皮膚炎症並控制感染, 適用於感染性濕疹和皮膚炎等同時伴隨細菌感染的情況。上述合併濕疹及細菌感染的狀況相當常見, 若能適時給予相關治療, 可以降低更嚴重感染的風險並減少後續的醫療耗用, 是臨床上重要的雙重治療選擇。乳膏、軟膏不同劑型, 適用於不同使用部位與族群, 建議同時保留。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議	157	3778	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
56	BIFONAZOLE	乳膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如足癬(香港腳)、股癬	1. 台灣外科醫學會:保留, 皮膚癬用藥 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	4	8	保留
57	BISACODYL	糖衣錠	暫時緩解便秘	1. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留, 便秘雖是常見醫療問題, 但可能與身體其他狀況相關, 且病患常有治療反應的個別性, 建議仍須醫師診療來開立。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 為兒童治療便秘之藥物, 有其必要性。但應由經兒科醫師確認兒童無便秘相關之潛在疾病, 與便秘嚴重度後, 方得依病情選用藥物開立使用。藥價不高, 建議保留 3. 台灣醫學會:保留, 臨床常用 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	375	607	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
58	BROMPHENIRAMINE	錠劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢	<p>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</p> <p>2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,是一種有效的抗組織胺藥物,用於緩解過敏性瘙癢、流鼻水、打噴嚏和蕁麻疹等常見的疾病與症狀。臨床上需多種抗組織胺藥物選擇,有助於個體化治療,幫助減少病人症狀,減少對其他更強效藥物的依賴。</p> <p>3. 台灣泌尿科醫學會:保留,該藥物為第一代H1 blocker,可能引起攝護腺肥大與膀胱失能患者之尿滯留等風險,應經醫師把關審核病史與藥物間交互影響,避免造成患者風險,衍生健保醫療費用支出。</p> <p>4. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。老年人比較容易有視力模糊、尿液滯留、口乾、便秘等副作用,宜在醫師診斷評估後小心使用。</p> <p>5. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</p> <p>6. 台灣外科醫學會:保留,鼻過敏用藥</p> <p>7. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>8. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>9. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	157	3778	保留
59	BUCLIZINE	錠劑	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹、預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀	<p>1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,Buclizine 是有效且低成本的治療選擇,它有效減少患者因皮膚搔癢、過敏、暈眩和噁心導致的生活品質下降,可以避免更昂貴的治療需求。建議保留給付能提升保險的整體成本效益。</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。老年人比較容易有視力模糊、尿液滯留、口乾、便秘等副作用,宜在醫師診斷評估後小心使用。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</p> <p>6. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>7. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>8. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	1034	4383	保留
60	CARBOCISTEINE	膜衣錠	減少呼吸道黏膜分泌的黏稠性	<p>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,Carbocisteine在肝、心臟患者宜小心使用,不可使用在胃與十二指腸潰瘍者,懷孕婦女最好禁止使用,所以開立只要宜在醫師仔細診斷評估下開立。</p> <p>2. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>4. 台灣內科醫學會:保留,緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物</p>	82	142	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
61	CARBOCISTEINE	膠囊劑	減少呼吸道黏膜分泌的黏稠性	<p>1. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留, 咳痰症狀的治療需考量病人整體病情, 經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量, 以達到緩解症狀並避免潛在副作用, 這些藥物非僅是緩解症狀, 也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付, 單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買, 有可能病人症狀未獲緩解, 或產生新問題反覆就醫, 徒增醫療支出。</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, Carbocisteine在肝、心臟患者宜小心使用, 不可使用在胃與十二指腸潰瘍者, 懷孕婦女最好禁止使用, 所以開立只要宜在醫師仔細診斷評估下開立。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性</p> <p>4. 台灣外科醫學會:保留, 化痰藥</p> <p>5. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>6. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>7. 台灣內科醫學會:保留, 緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物</p>	507	963	保留
62	CARBOCISTEINE	錠劑	減少呼吸道黏膜分泌的黏稠性	<p>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, Carbocisteine在肝、心臟患者宜小心使用, 不可使用在胃與十二指腸潰瘍者, 懷孕婦女最好禁止使用, 所以開立只要宜在醫師仔細診斷評估下開立。</p> <p>2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性</p> <p>3. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p>	829	1509	保留
63	CASCARA	糖衣錠	便秘	<p>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 急性腹部疾患(闌尾炎、腸出血、潰瘍性結腸炎等)禁用本品。</p> <p>2. 臺灣兒科醫學會:保留, 為兒童治療便秘之藥物, 有其必要性。但應由經兒科醫師確認兒童無便秘相關之潛在疾病, 與便秘嚴重度後, 方得依病情開立使用。藥價不高, 建議保留</p> <p>3. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>5. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	6	6	保留
64	CENTELLA ASIATICA HERBA	軟膏劑	灼傷、燙傷、外傷、開刀創傷、皮膚移植、潰瘍及褥瘡	<p>1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, 雷公根(學名:Centella asiatica)具有幫助傷口癒合和抗炎效果, 可有效用於治療疤痕、小傷口及減少炎症反應。此藥物對於患者皮膚癒合過程中減少疤痕的形成具有效果, 並能減少日後更多侵入性治療的需求, 建議保留以支持慢性皮膚病患的恢復需求。</p> <p>2. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p>	1	6	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
65	CHLORPHENAMINE	錠劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</li> <li>2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,是便宜且有效的第一代抗組織胺,用於緩解過敏症狀(如皮膚癢、流鼻水、打噴嚏和皮疹)、蕁麻疹。臨床上需多種抗組織胺藥物選擇,建議保留此藥物以減少更高昂的治療需求,有助於提升整體成本效益。</li> <li>3. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留,咳痰症狀的治療需考量病人整體病情,經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量,以達到緩解症狀並避免潛在副作用,這些藥物不僅是緩解症狀,也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付,單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買,有可能病人症狀未獲緩解,或產生新問題反覆就醫,徒增醫療支出。</li> <li>4. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。老年人比較容易有視力模糊、尿液滯留、口乾、便秘等副作用,宜在醫師診斷評估後小心使用。</li> <li>5. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</li> <li>6. 台灣外科醫學會:保留,過敏性鼻炎用藥</li> <li>7. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>8. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</li> <li>9. 台灣內科醫學會:未表示意見</li> </ol>	822	4149	保留
66	CHLORPHENAMINE, COMBINATIONS (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + GLYCYRRHIZIC ACID (=GLYCYRRHETINIC ACID GLYCOSIDE) + NIACINAMIDE (=NICOTINAMIDE) + PANTOTHENATE CALCIUM + PYRIDOXINE + RIBOFLAVIN (=VIT B2))	膜衣錠	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</li> <li>2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,是便宜且有效的第一代抗組織胺,用於緩解過敏症狀(如皮膚癢、流鼻水、打噴嚏和皮疹)、蕁麻疹。臨床上需多種抗組織胺藥物選擇,建議保留此藥物以減少更高昂的治療需求,有助於提升整體成本效益。</li> <li>3. 台灣外科醫學會:保留,過敏性鼻炎用藥</li> <li>4. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</li> <li>6. 台灣內科醫學會:未表示意見</li> </ol>	116	188	保留
67	CHLORPHENAMINE, COMBINATIONS (複方:BIOTIN + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + GLYCYRRHIZIN (AMMONIATED) + NIACINAMIDE (=NICOTINAMIDE) + PANTOTHENATE CALCIUM + PYRIDOXINE HCL + RIBOFLAVIN (=VIT B2))	錠劑	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,有些人使用抗組織胺,例如:懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓,以及心、肝、腎功能不佳的人,務必經過醫師或藥師的指示再使用,以免造成健康風險。此外,哺乳婦女若服用抗組織胺,可能會有少量存在於乳汁中,因此不建議哺乳婦女使用。</li> <li>2. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</li> </ol>	31	49	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
68	CIMETIDINE	錠劑	胃、十二指腸潰瘍、胃腸道出血及胃泌素瘤症候群	<p>1. 台灣神經學學會:保留,無說明理由</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, Cimetidine具有微弱的抗雄性激素作用,其於治療一個月或更長的時間之後,可能有男性乳房增殖之現象,宜在醫師仔細評估下小心使用。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留,為治療消化性潰瘍與降低胃酸分泌之治療藥物,但應由醫師確認兒童消化性潰瘍原因後,方建議開立使用此一藥物。藥價不高,建議保留</p> <p>4. 台灣醫學會:保留,臨床常用</p> <p>5. 台灣精神醫學會:保留,指示用藥皆有醫師診治後適用的適應症,且費用不高,宜保留並開立予有需要的病患,避免因未有給付,使健保治療反而競逐較高價的同類健保給付之藥物。</p> <p>6. 社團法人台灣皮膚科醫學會:其他,無表示意見</p> <p>7. 台灣醫學會:保留,臨床常用</p> <p>8. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p>	44	61	保留
69	CLEMASTINE	錠劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	<p>1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Clemastine 是一種便宜有效的抗組織胺藥物。臨床上需多種抗組織胺藥物選擇,有助於個體化治療,可以減少對其他更強效藥物的需求。</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,有些人使用抗組織胺,例如:懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓,以及心、肝、腎功能不佳的人,務必經過醫師或藥師的指示再使用,以免造成健康風險。此外,哺乳婦女若服用抗組織胺,可能會有少量存在於乳汁中,因此不建議哺乳婦女使用。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</p> <p>4. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>6. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	107	250	保留
70	CLOTRIMAZOLE	外用液劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如足癬(香港腳)、體癬、股癬、汗斑	<p>1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,皮膚表淺性真菌感染疾病是蜂窩性組織炎、嚴重軟組織感染的重要危險因子,因此健保給付治療皮膚黴菌感染的外用藥劑,可以有效減少上述嚴重感染的發生率,有效減少整體的醫療耗用和提升民眾健康。目前雖然健保給付有數種皮膚抗黴菌藥膏種類(例如: isoconazole、miconazole),但是將多種不同類型藥物納入表淺性真菌感染給付範圍的其中一個重要理由,是近年來黴菌抗藥性問題日益變得嚴重,臨床醫師需要有多種藥物提供選擇及輪替使用,可以減少產生真菌的抗藥性及治療有抗藥性的菌種。因此建議保留。</p> <p>2. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>4. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	2	9	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
71	CLOTRIMAZOLE	乳膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如足癬(香港腳)、股癬、汗斑	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</li> <li>2. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由</li> <li>3. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,理由同CLOTRIMAZOLE外用液劑,乳膏、軟膏不同劑型,適用於不同使用部位與族群,建議同時保留。</li> <li>4. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,此藥膏的副作用包括搔癢、灼熱、發紅腫脹、胃痛、發燒、惡臭分泌物(使用陰道製劑時),宜在醫師正確診斷下小心使用。</li> <li>5. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</li> <li>6. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>7. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</li> <li>8. 台灣內科醫學會:未表示意見</li> </ol>	638	5725	保留
72	COMBINATIONS OF ANTIHISTAMINES (複方:CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + MECLIZINE HCL + PYRIDOXINE HCL)	錠劑	預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</li> <li>2. 台灣神經學學會:保留,無說明理由</li> <li>3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,有些人使用抗組織胺,例如:懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓,以及心、肝、腎功能不佳的人,務必經過醫師或藥師的指示再使用,以免造成健康風險。此外,哺乳婦女若服用抗組織胺,可能會有少量存在於乳汁中,因此不建議哺乳婦女使用。</li> <li>4. 台灣外科醫學會:保留,暈動症治療藥</li> <li>5. 台灣精神醫學會:保留,指示用藥皆有醫師診治後適用的適應症,且費用不高,宜保留並開立予有需要的病患,避免因未有給付,使健保治療反而競逐較高價的同類健保給付之藥物。</li> <li>6. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>7. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</li> <li>8. 台灣內科醫學會:未表示意見</li> </ol>	60	105	保留
73	DEXAMETHASONE	軟膏劑	急性、慢性濕疹、小兒濕疹、脂漏性濕疹、貨幣狀濕疹、接觸性皮炎、藥物性皮炎、神經性皮炎、皮膚搔癢症、蕁麻疹、乾癬、紅皮症、昆蟲刺傷	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</li> <li>2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,強效局部類固醇,用於控制濕疹、牛皮癬和接觸性皮炎等常見皮膚炎症。其抗炎效果顯著,特別適合需要短期、強效治療的患者。此外,針對急性皮膚發炎患者提供不同強度的類固醇選擇十分重要。建議保留以滿足不同患者的需求,並降低長期醫療成本。</li> <li>3. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</li> </ol>	4	7	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
74	DEXCHLORPHENIRAMINE	錠劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	<p>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</p> <p>2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,是便宜且有效的組織胺,用於緩解過敏症狀(如皮膚癢、流鼻水、打噴嚏和皮疹)、蕁麻疹。臨床上需多種抗組織胺藥物選擇,建議保留此藥物以減少其他更高昂的治療需求,有助於提升整體成本效益。</p> <p>3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,有些人使用抗組織胺,例如:懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓,以及心、肝、腎功能不佳的人,務必經過醫師或藥師的指示再使用,以免造成健康風險。此外,哺乳婦女若服用抗組織胺,可能會有少量存在於乳汁中,因此不建議哺乳婦女使用。</p> <p>4. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</p> <p>5. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>6. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>7. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	3065	12364	保留
75	DEXTROMETHORPHAN	錠劑	鎮咳	<p>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</p> <p>2. 台灣消化系醫學會:其他,消化系醫師少用,無意見。</p> <p>3. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由</p> <p>4. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留,咳痰症狀的治療需考量病人整體病情,經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量,以達到緩解症狀並避免潛在副作用,這些藥物不僅是緩解症狀,也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付,單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買,有可能病人症狀未獲緩解,或產生新問題反覆就醫,徒增醫療支出。</p> <p>5. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,此藥的副作用如:嗜眠、暈眩、腸胃不適、腹瀉、便秘、噁心、嘔吐等。宜在醫師正確診斷評估下小心使用。</p> <p>6. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</p> <p>7. 台灣外科醫學會:保留,鎮咳藥</p> <p>8. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>9. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>10. 台灣內科醫學會:保留,未說明理由</p>	1049	6779	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
76	DICLOFENAC	外用凝膠劑	短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣復健醫學會:保留, 臨床上有效</li> <li>2. 中華民國骨科醫學會:保留, 無說明理由</li> <li>3. 台灣神經學學會:保留, 無說明理由</li> <li>4. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 使用此藥可能會產生皮膚紅腫、光過敏、水泡、蕁麻疹、呼吸出現喘鳴聲、呼吸道出現腫脹的現象。宜在醫師詢問藥物過敏史之下小心評估使用。</li> <li>5. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性</li> <li>6. 台灣外科醫學會:保留, 止痛藥</li> <li>7. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>8. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</li> <li>9. 台灣麻醉醫學會:其他, 表單內用藥都是一般內外科止痛用藥, 並非麻醉用藥, 他們對於這些用藥品沒有意見</li> <li>10. 台灣內科醫學會:未表示意見</li> </ol>	1215	7758	保留
77	DICLOFENAC	乳膏劑	短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣婦產科醫學會:保留, 臨床確實有需要</li> <li>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 使用此藥可能會產生皮膚紅腫、光過敏、水泡、蕁麻疹、呼吸出現喘鳴聲、呼吸道出現腫脹的現象。宜在醫師詢問藥物過敏史之下小心評估使用。</li> <li>3. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</li> <li>5. 台灣麻醉醫學會:其他, 表單內用藥都是一般內外科止痛用藥, 並非麻醉用藥, 他們對於這些用藥品沒有意見</li> </ol>	13	17	保留
78	DICLOFENAC	乳膠劑	短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中華民國骨科醫學會:保留, 無說明理由</li> <li>2. 台灣神經學學會:保留, 無說明理由</li> <li>3. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</li> <li>5. 台灣麻醉醫學會:其他, 表單內用藥都是一般內外科止痛用藥, 並非麻醉用藥, 他們對於這些用藥品沒有意見</li> <li>6. 台灣內科醫學會:未表示意見</li> </ol>	17	70	保留
79	DICLOFENAC	軟膏劑	短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中華民國骨科醫學會:保留, 無說明理由</li> <li>2. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</li> <li>4. 台灣麻醉醫學會:其他, 表單內用藥都是一般內外科止痛用藥, 並非麻醉用藥, 他們對於這些用藥品沒有意見</li> <li>5. 台灣內科醫學會:未表示意見</li> </ol>	51	89	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
80	DIPHENHYDRAMINE (複方:CALAMINE + CAMPBOR + DIPHENHYDRAMINE HCL)	洗劑	暫時緩解皮膚搔癢、 緩解皮膚刺激及尿布 疹	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留， 含有Diphenhydramine 洗劑，例如: Calamine lotion，能快速緩解癢癢及 皮膚過敏反應。局部使用相關藥物能 降低患者對全身性藥物的需求，減少 及避免系統性抗組織胺或類固醇藥物 的副作用，是經濟實惠的治療又能提 升照護品質。建議保留。 2. 臺灣兒科醫學會:保留，具臨床療效 與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他，無其他 相關建議	185	726	保留
81	DIPHENHYDRAMINE	膜衣錠	緩解過敏性鼻炎、枯 草熱所引起之相關症 狀(流鼻水、打噴 嚏、眼睛及喉部搔 癢)及過敏所引起之 搔癢、皮膚癢疹	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留， 是便宜且有效的組織胺，用於緩解過 敏症狀(如皮膚癢、流鼻水、打噴嚏 和皮疹)、蕁麻疹。臨床上需多種抗 組織胺藥物選擇，建議保留此藥物以 減少其他更高昂的治療需求，有助於 提升整體成本效益。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他，無其他 相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	300	2153	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
82	DIPHENHYDRAMINE	膠囊劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	<p>1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,是便宜且有效的組織胺,用於緩解過敏症狀(如皮膚癢、流鼻水、打噴嚏和皮疹)、蕁麻疹。臨床上需多種抗組織胺藥物選擇,建議保留此藥物以減少其他更高昂的治療需求,有助於提升整體成本效益。</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,有些人使用抗組織胺,例如:懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓,以及心、肝、腎功能不佳的人,務必經過醫師或藥師的指示再使用,以免造成健康風險。此外,哺乳婦女若服用抗組織胺,可能會有少量存在於乳汁中,因此不建議哺乳婦女使用。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</p> <p>4. 台灣精神醫學會:保留,指示用藥皆有醫師診治後適用的適應症,且費用不高,宜保留並開立予有需要的病患,避免因未有給付,使健保治療反而競逐較高價的同類健保給付之藥物。</p> <p>5. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>6. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>7. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	458	4303	保留
83	DIPHENHYDRAMINE	錠劑	預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀	<p>1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,是便宜且有效的組織胺,用於緩解過敏症狀(如皮膚癢、流鼻水、打噴嚏和皮疹)、蕁麻疹。臨床上需多種抗組織胺藥物選擇,建議保留此藥物以減少其他更高昂的治療需求,有助於提升整體成本效益。</p> <p>2. 台灣神經學學會:保留,無說明理由</p> <p>3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,有些人使用抗組織胺,例如:懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓,以及心、肝、腎功能不佳的人,務必經過醫師或藥師的指示再使用,以免造成健康風險。此外,哺乳婦女若服用抗組織胺,可能會有少量存在於乳汁中,因此不建議哺乳婦女使用。</p> <p>4. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>6. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	806	3420	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
84	DIPHENHYDRAMINE, COMBINATIONS (複方:CAFFEINE ANHYDROUS + DIMENHYDRINATE)	錠劑	預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 有些人使用抗組織胺, 例如: 懷孕婦女、攝護腺肥大、排尿困難、青光眼、高血壓, 以及心、肝、腎功能不佳的人, 務必經過醫師或藥師的指示再使用, 以免造成健康風險。此外, 哺乳婦女若服用抗組織胺, 可能會有少量存在於乳汁中, 因此不建議哺乳婦女使用。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 為兒童頭暈常要藥物, 但有嗜眠、頭暈、疲倦、神經質之副作用。應由醫師評估使用之必要性, 與權衡利弊後、決定是否開立。藥價不高, 建議保留 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	198	7052	保留
85	DIPHENYLPYRALINE	錠劑	過敏性皮膚炎、過敏性氣喘、過敏性鼻炎、藥物或食物過敏、皮膚搔癢症、濕疹、蕁麻疹、枯草熱、暈動症	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, 是便宜且有效的組織胺, 用於緩解過敏症狀(如皮膚癢、流鼻水、打噴嚏和皮疹)、蕁麻疹。臨床上需多種抗組織胺藥物選擇, 建議保留此藥物以減少其他更高昂的治療需求, 有助於提升整體成本效益。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議	192	361	保留
86	DIPROPHYLLINE AND ADRENERGICS (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + DIPROPHYLLINE + GLYCYRRHIZA RADIX POWDER + GUAIACOL GLYCERYL ETHER (=GUAIFENESIN) + IPECAC RADIX POWDER + METHYLEPHEDRINE DL-HCL)	糖衣錠	氣喘、小兒氣喘、支氣管炎、感冒等所引起之咳嗽及喀痰之緩解	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 此類藥物若使用劑量不慎, 容易造成心悸, 宜在醫師仔細評估下小心使用。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議	1	2	保留
87	EPRAZINONE	錠劑	支氣管擴張症、支氣管性氣喘、急慢性支氣管炎、上呼吸道炎、感冒等引起之鎮咳及祛痰	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 此藥易刺激消化器官, 造成食慾不振、噁心、嘔吐、胃部不快、腹痛, 頭痛等。宜在醫師仔細評估下使用。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:保留, 緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物	1416	2435	保留
88	ETOFENAMATE	外用凝膠劑	肌肉性風濕症、上腕肩胛關節周圍炎、腰痛、坐骨神經痛、腱鞘炎、粘液囊炎	1. 台灣復健醫學會:保留, 臨床上對肌肉疼痛有不錯效果 2. 中華民國骨科醫學會:保留, 無說明理由 3. 台灣神經學學會:保留, 無說明理由 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣麻醉醫學會:其他, 表單內用藥都是一般內外科止痛用藥, 並非麻醉用藥, 他們對於這些用藥品沒有意見 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	164	3851	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
89	FLAVINEADENINE DINUCLEOTIDE (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + FLAVINEADENINE DINUCLEOTIDE + GLYCYRRHIZATE DIPOTASSIUM + PYRIDOXINE HCL + TAURINE)	點眼液劑	眼睛疲勞、眼睛癢、 暫時緩解因輕微眼部 刺激所引起之不適	1. 台灣醫學會:未表示意見 2. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他 相關建議 3. 中華民國眼科醫學會:保留, 未表示 意見 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	195	699	保留、其他、未表示 意見
90	GUAIFENESIN	錠劑	祛痰	1. 台灣婦產科醫學會:保留, 臨床確實 有需要 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 此藥可能有噁心、嘔吐、頭痛、暈眩 等副作用, 宜在醫師仔細評估下小心 使用。 3. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效 與醫療必要性 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他 相關建議 6. 台灣內科醫學會:保留, 緩解支氣管 炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物	180	263	保留
91	HEPARIN, COMBINATIONS (複方:HEPARIN SODIUM + HYDROCORTISONE ACETATE)	乳膏劑	炎症性疾患、外傷後 之腫脹	1. 台灣復健醫學會:其他, 無說明理由 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Heparin 乳膏劑具有抗凝血和抗炎作 用, 用於減少瘀青、腫脹以及改善血 液循環, 適用於靜脈曲張、瘀血、及 局部皮膚炎症等。其組合成分能加強 療效, 提供加速癒合及減輕不適的效 果。特別是在不適合內服抗凝血劑的 患者中, Heparin 乳膏劑可作為安全 的外用輔助治療選擇, 建議保留以滿 足不同患者的需求並支持其康復。 3. 台灣外科醫學會:保留, 外傷後腫脹 化瘀藥 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他 相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	6	12	保留
92	HYDROCORTISONE (複方:ALUMINUM ACETATE + HYDROCORTISONE ACETATE + LIDOCAINE + ZINC OXIDE)	栓劑	痔瘡、肛門裂傷、肛 門周圍膿腫及脫肛	1. 台灣婦產科醫學會:保留, 臨床確實 有需要 2. 台灣消化系醫學會:保留, 主要作為 痔瘡患者緩解症狀使用, 痔瘡患者相 當多, 臨床使用量大, 安全有效。建 議參酌使用量大之大腸直腸外科醫 學會意見。 3. 台灣外科醫學會:保留, 痔瘡用藥 4. 中華民國大腸直腸外科醫學會:保留 , 本學會建議全數保留, 此類藥物皆 為直外門診常用藥物, 且需經專科醫 師評估過後才能依實際病症開立使 用。為維護病患權益及避免病患自行 購買不適當的藥物塗抹而延誤病情, 加上栓劑和藥膏皆有其使用之方便性 , 故建議此類藥物全數保留。 5. 台灣醫學會:未表示意見 6. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他 相關建議 7. 台灣內科醫學會:未表示意見	560	2743	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
93	HYDROCORTISONE (複方:HYDROCORTISONE ACETATE + UREA)	霜劑	暫時緩解濕疹、蚊蟲 咬傷、皮膚炎、皮膚 搔癢等疾患的症狀	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,外用藥物的治療準則,使用相同的治療成分在不同皮膚部位、不同的臨床狀況,臨床醫師會需要不同劑型(例如:洗劑、乳膏、乳霜、...)選擇使用,才能達到好的治療效果。建議同時保留hydrocortisone的不同劑型。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	268	1061	保留
94	HYDROCORTISONE AND ANTIBIOTICS (複 方:DIPHENYLPYRALINE HCL + HYDROCORTISONE + NEOMYCIN (SULFATE) + NYLIDRIN HCL)	軟膏劑	濕疹、皮膚炎、牛皮 癬、濕疹性乾癬、皮 膚搔癢症	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實 有需要 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他 相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	3	3	保留
95	IBUPROFEN	膜衣錠	慢性關節風濕症、關 節痛、關節炎、神經 痛、神經炎、背腰 痛、上氣道炎之消 炎、鎮痛	1. 台灣復健醫學會:保留,臨床使用上 有效 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:其他, 常見且有效的一種NSAID,惟此項目非 皮膚科常用且不可取代項目,因此無 法表達意見。 3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 服用此藥可能產生腹痛、便秘、腹 瀉、食慾不振、心灼熱、噁心、頭 昏、頭痛、嗜睡、體液滯留、耳鳴, 嚴重的藥物過敏如氣喘、皮膚過敏, 宜在醫師仔細評估下謹慎使用。 4. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效 與醫療必要性 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他 相關建議 6. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥 都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉 用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 7. 台灣內科醫學會:未表示意見	335	595	保留
96	IBUPROFEN	膠囊劑	暫時性解除頭痛肌肉 疼痛	1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實 有需要 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:其他, 常見且有效的一種NSAID,惟此項目非 皮膚科常用且不可取代項目,因此無 法表達意見。 3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 服用此藥可能產生腹痛、便秘、腹 瀉、食慾不振、心灼熱、噁心、頭 昏、頭痛、嗜睡、體液滯留、耳鳴, 嚴重的藥物過敏如氣喘、皮膚過敏, 宜在醫師仔細評估下謹慎使用。 4. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效 與醫療必要性 5. 台灣醫學會:未表示意見 6. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他 相關建議 7. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥 都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉 用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 8. 台灣內科醫學會:未表示意見	166	338	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
97	IBUPROFEN	糖衣錠	關節痛及關節炎、神經痛及神經炎、慢性關節風濕症、背腰痛、手術及外傷之消炎	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,服用此藥可能產生腹痛、便秘、腹瀉、食慾不振、心灼熱、噁心、頭昏、頭痛、嗜睡、體液滯留、耳鳴,嚴重的藥物過敏如氣喘、皮膚過敏,宜在醫師仔細評估下謹慎使用。 2. 台灣精神醫學會:保留,指示用藥皆有醫師診治後適用的適應症,且費用不高,宜保留並開立予有需要的病患,避免因未有給付,使健保治療反而競逐較高價的同類健保給付之藥物。 3. 社團法人中華牙醫學會:其他,暫無建議。 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見	2	2	保留
98	IBUPROFEN	錠劑	慢性關節風濕病、關節痛及關節炎、神經痛及神經炎、背腰痛手術及外傷後之消炎、鎮痛	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,服用此藥可能產生腹痛、便秘、腹瀉、食慾不振、心灼熱、噁心、頭昏、頭痛、嗜睡、體液滯留、耳鳴,嚴重的藥物過敏如氣喘、皮膚過敏,宜在醫師仔細評估下謹慎使用。 2. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣外科醫學會:保留,止痛藥 4. 社團法人中華牙醫學會:其他,暫無建議。 5. 台灣醫學會:未表示意見 6. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 7. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 8. 台灣內科醫學會:未表示意見	331	579	保留
99	IMIDAZOLES/TRIAZOLES IN COMBINATION WITH CORTICOSTEROIDS (複方:ECONAZOLE NITRATE + TRIAMCINOLONE ACETONIDE)	軟膏劑	治療皮膚表淺性黴菌感染、如足癬(香港腳)、股癬、汗斑、緩解濕疹或皮膚炎	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,需要在醫師正確的診斷下才能使用。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	339	727	保留
100	INDOMETACIN	外用液劑	暫時緩解局部疼痛	1. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由 2. 台灣外科醫學會:保留,止痛藥 3. 台灣復健醫學會:其他,無說明理由 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見	43	108	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
101	INDOMETACIN	外用凝膠劑	暫時緩解局部疼痛	<p>1. 台灣復健醫學會:其他,無說明理由</p> <p>2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Indometacin 外用劑型可針對局部疼痛和炎症提供有效緩解,特別適用於局部關節炎、肌肉拉傷及皮膚發炎狀況,減少患者因疼痛使用全身性止痛藥的需求,降低系統性副作用風險。此藥物具有較高的成本效益,能為患者提供即時且安全的外用疼痛管理選擇,提升保險的成本效益。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</p> <p>4. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>6. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見</p>	159	317	保留
102	LOPERAMIDE	膠囊劑	暫時緩解輕微或中度急性腹瀉	<p>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,此藥是胃腸蠕動抑制劑,顧名思義該藥物會讓腸子蠕動變慢甚至完全不動,有立即且顯著的止瀉效果,但若是細菌性腸胃炎,也因此增加了病菌與毒素滯留在腸子內的時間,反而易有嚴重腹脹、腸阻塞、膽汁性嘔吐等副作用,對於腸胃炎的治療完全沒有幫助,甚至讓病情更加嚴重,應該盡量避免使用在小朋友身上!宜經醫師仔細診斷後使用。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留,為腹瀉使用之藥物,除應由醫師確認腹瀉致病原因與程度後,方得開立使用。也應由醫師評估是否會有毒性巨結腸症之可能,方才決定是否使用此一藥物。藥價不高,建議保留</p> <p>4. 台灣外科醫學會:保留,緩瀉藥</p> <p>5. 台灣醫學會:保留,臨床常用</p> <p>6. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>7. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	13	17	保留
103	LORATADINE	口溶錠	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)或過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	<p>1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,是便宜且有效的第二代組織胺,用於緩解過敏症狀(如皮膚癢、流鼻水、打噴嚏和皮疹)、蕁麻疹。臨床上需多種抗組織胺藥物選擇,且第二代藥物比較不會有嗜睡、鎮靜、尿液滯留的風險,建議保留此藥物,可以減少病患需要其他更高昂的治療,有助於提升整體成本效益。</p> <p>2. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>4. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	5	20	保留
104	LORATADINE	錠劑	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)或過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹	<p>1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,不同劑型,建議保留。</p> <p>2. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</p> <p>3. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p>	21	35	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
105	MAGNESIUM HYDROXIDE	錠劑	緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 此藥若使用過量, 將造成腹瀉、噁心、嘔吐、嚴重腹痛、過敏、暈眩、頭昏眼花、心跳不規則、心情或精神改變、異常疲倦或虛弱(可能為高鎂血症或其他電解質不平衡)。宜經醫師評估後使用。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	228	332	保留
106	MAGNESIUM OXIDE	錠劑	緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多	1. 台灣消化系醫學會:保留, 1. 慢性便秘患者相當多, 臨床使用量大, 安全有效2. 醫學文獻證明對治療慢性便秘有效J Neurogastroenterol Motil 2019;25:563-575 Am J Gastroenterol 2021;116:152-161 2. 台灣神經學學會:保留, 無說明理由 3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 此藥若使用過量, 將造成腹瀉、噁心、嘔吐、嚴重腹痛、過敏、暈眩、頭昏眼花、心跳不規則、心情或精神改變、異常疲倦或虛弱(可能為高鎂血症或其他電解質不平衡)。宜經醫師評估後使用。 4. 臺灣兒科醫學會:保留, 為兒童治療便秘之藥物, 有其必要性。但應由經兒科醫師確認兒童無便秘相關之潛在疾病, 與便秘嚴重度後, 方得依病情選用藥物開立使用。該藥物對降低胃酸也有其助益, 但應由醫師權衡是否會有腹瀉之副作用, 方才開立使用 5. 台灣精神醫學會:保留, 指示用藥皆有醫師診治後適用的適應症, 且費用不高, 宜保留並開立予有需要的病患, 避免因未有給付, 使健保治療反而競逐較高價的同類健保給付之藥物。 6. 台灣醫學會:未表示意見 7. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 8. 台灣內科醫學會:未表示意見	4625	30605	保留
107	MECLOZINE	錠劑	預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀	1. 台灣神經學學會:保留, 無說明理由 2. 中華民國心臟學會:保留, 預防或緩解動暈症, 仍有其角色 3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 此藥為治療動暈症藥物, 但亦可能有頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢、視覺上之副作用, 宜經醫師仔細評估下使用。 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	1209	9534	保留
108	MECLOZINE, COMBINATIONS (複方:MECLIZINE HCL + PYRIDOXINE HCL)	錠劑	預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 此藥為治療動暈症藥物, 但亦可能有頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢、視覺上之副作用, 宜經醫師仔細評估下使用。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 仍然是預防或緩解動暈症的藥物 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	54	96	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
109	MESULFEN	軟膏劑	疥癬、頑癬、白癬及其他寄生性皮膚疾患之治療及止癢	<p>1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Mesulphen? (2-7-Dimethylthianthrene), 為一種有機硫磺化合物, 對皮膚寄生蟲(如疥蟲、蝨蟲)及絲狀菌(如白癬)具有發育阻止, 止癢及消炎等作用。它是疥瘡治療的其中一種便宜、有效的外用藥物; 近年來皮膚寄生蟲的抗藥性問題日趨嚴重, 臨床治療上需要保留多種可供選擇的藥物, 以應付並減少可能的抗藥性疥瘡流行, 因此建議保留。</p> <p>2. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留, 咳痰症狀的治療需考量病人整體病情, 經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量, 以達到緩解症狀並避免潛在副作用, 這些藥物不僅是緩解症狀, 也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付, 單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買, 有可能病人症狀未獲緩解, 或產生新問題反覆就醫, 徒增醫療支出。</p> <p>3. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p>	44	61	保留
110	MULTIENZYMES (LIPASE, PROTEASE ETC.)	膜衣錠	幫助消化	<p>1. 台灣消化系醫學會:保留, 主要用於外科術後消化酵素分泌不足之患者, 有其必要性, 建議參酌外科醫學會意見。</p> <p>2. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>4. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	469	3892	保留
111	NAPHAZOLINE (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + NAPHAZOLINE HCL)	外用液劑	急性鼻炎、過敏性鼻炎、鼻蓄膿症	<p>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 宜在醫師的指示下使用, 否則易產生藥物性鼻炎。</p> <p>2. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p>	2	2	保留
112	NAPHAZOLINE (複方:CHLOROBUTANOL (=TRICHLORISOBUTYLIC ALCOHOL) + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + NAPHAZOLINE HCL)	點鼻液劑	暫時緩解因鼻炎、過敏性鼻炎、過敏或感冒引起之鼻塞、流鼻水、打噴嚏症狀	<p>1. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性</p> <p>2. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>4. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	2	9	保留
113	NOSCAPINE	錠劑	鎮咳	<p>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, Noscaphine主要功用為鎮咳, 常見副作用為嗜睡、噁心、頭痛和眩暈。吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患(包括如慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起之咳嗽, 及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。宜經醫師審慎評估下使用。</p> <p>2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性</p> <p>3. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>5. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	1890	3358	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
114	OPIUM DERIVATIVES AND MUCOLYTICS (複方:DEXTROMETHORPHAN HBR + LYSOZYME (CHLORIDE) + POTASSIUM CRESOLSULFONATE)	膠囊劑	鎮咳、祛痰	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, Opium alkaloid 藥物中常見副作用包括心跳加速、躁動、高血壓、胸痛、顫抖、幻覺、錯覺、迷惑、噁心和嘔吐等,是屬於管制類用藥,宜經醫師仔細評估下小心使用。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留,緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物	61	101	保留
115	ORGANO-HEPARINOID	外用凝膠劑	鈍物創傷後之血腫、淺層性靜脈炎之局部治療	1. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Organo-Heparinoid 是具抗凝血及抗炎作用的外用藥物,適用於瘀青、血腫及靜脈曲張等血液循環不佳的狀況。此藥物能減少腫脹和疼痛,並改善局部血液循環,對於預防血栓形成及減少併發症有重要意義。保留此藥物可減少後續比較昂貴的改善血液循環藥物或治療的需求,降低整體醫療成本。 3. 台灣外科醫學會:保留,化瘀藥 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	1233	3063	保留
116	ORGANO-HEPARINOID	軟膏劑	鈍物創傷後之血腫、淺層性靜脈炎之局部治療	1. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由 2. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,軟膏和外用凝膏劑型的Organo-Heparinoid 都具有相同療效,但在不同部位有不同劑型的需求,因此建議兩種都保留。 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	107	250	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
117	OTHER DRUGS FOR ACID RELATED DISORDERS (複方:OXETHAZINE)	錠劑	胃炎、腸炎、食道炎所伴隨之胃痛、胃酸過多、胃部不適或灼熱感	<p>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, O+G37:G50xethaine 在胃藥中的應用主要是因為其具有抗酸和局部麻醉的特性。Oxethaine 作為胃藥成分的主要優點:(1) 局部麻醉作用:Oxethaine 可在胃壁表面產生局部麻醉效果,緩解因胃酸過多或潰瘍引起的疼痛與灼熱感。(2) 快速緩解症狀與其他成分(如抗酸劑)聯合作用時,能迅速緩解胃酸倒流、胃灼熱及胃部不適。(3) 穩定的藥效它能在胃內形成保護層,減少胃酸對胃黏膜的刺激,特別適用於胃潰瘍或胃炎患者。</p> <p>(4) 與抗酸劑的協同作用Oxethaine 常與抗酸劑(如氫氧化鋁、氫氧化鎂)搭配使用,既中和胃酸,又緩解疼痛,提供綜合性的治療效果。</p> <p>(5) 適合長期使用:其作用溫和,通常不會對胃黏膜產生刺激,適合需要長期控制胃酸分泌或減輕胃部疼痛的患者。(6) 耐受性良好:Oxethaine 的使用安全性較高,對大多數患者具有良好的耐受性,副作用較少。佔在腸胃炎的治療上有其重要的地位,取消給付將嚴重影響病人就醫的權益。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留,為治療消化性潰瘍、降低胃酸分泌與胃食道逆流使用治療藥物,但應由醫師確認兒童消化性潰瘍與胃酸過度分泌原因與疾病嚴重度後,方建議開立使用此一藥物。藥價不高 建議保留</p> <p>4. 台灣醫學會:保留,臨床常用藥物之一</p> <p>5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p> <p>6. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	536	830	保留
118	OXYMETAZOLINE	鼻用噴液劑	暫時緩解因鼻炎、過敏性鼻炎、過敏或感冒引起之鼻塞、流鼻水症狀	<p>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,宜在醫師的指示下使用,否則易產生藥物性鼻炎。</p> <p>2. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</p> <p>3. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</p>	377	2312	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
119	PARACETAMOL	錠劑	退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</li> <li>2. 社團法人台灣急診醫學會:保留,乙醯胺酚(Paracetamol)的臨床用途廣泛,用量大且價格低廉,建議至少保留一種廠牌供臨床使用</li> <li>3. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由</li> <li>4. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留,臨床非常便宜、有效、安全的第一線退燒、止痛藥物,建議保留。</li> <li>5. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,正確使用acetaminophen可解熱鎮痛,但長期或過量使用含acetaminophen成分之藥品,可能導致嚴重肝臟傷害。服用普拿疼且飲酒,會造成肝臟損傷危險性升高。況且發燒宜找出原因,不是一味地吃退燒藥退燒,故宜經醫師確實診斷後開立使用。</li> <li>5. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</li> <li>6. 台灣外科醫學會:保留,止痛藥</li> <li>7. 台灣醫學會:保留,臨床常用</li> <li>8. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</li> <li>9. 中華民國眼科醫學會:保留,未表示意見</li> <li>10. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見</li> <li>11. 台灣內科醫學會:未表示意見</li> </ol>	6725	39611	保留
120	PARACETAMOL, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE ANHYDROUS)	錠劑	退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、關節痛、咽喉痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣婦產科醫學會:保留,臨床確實有需要</li> <li>2. 中華民國骨科醫學會:保留,無說明理由</li> <li>3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,正確使用acetaminophen可解熱鎮痛,但長期或過量使用含acetaminophen成分之藥品,可能導致嚴重肝臟傷害。服用普拿疼且飲酒,會造成肝臟損傷危險性升高。況且發燒宜找出原因,不是一味地吃退燒藥退燒,故宜經醫師確實診斷後開立使用。</li> <li>4. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</li> <li>5. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>6. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</li> <li>7. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見</li> <li>8. 台灣內科醫學會:未表示意見</li> </ol>	1216	3562	保留
121	PENTOXYVERINE	糖衣錠	鎮咳	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性</li> <li>2. 台灣外科醫學會:保留,鎮咳</li> <li>3. 台灣醫學會:未表示意見</li> <li>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議</li> </ol>	19	24	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
122	PENTOXYVERINE	錠劑	鎮咳	<p>1. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留, 咳痰症狀的治療需考量病人整體病情, 經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量, 以達到緩解症狀並避免潛在副作用, 這些藥物不僅是緩解症狀, 也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付, 單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買, 有可能病人症狀未獲緩解, 或產生新問題反覆就醫, 徒增醫療支出。</p> <p>2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 服用本藥偶有頭重、不快感、便秘、口渴、食慾不振、尿量減少, 皮膚發疹過敏現象, 宜經醫師仔細評估下使用。</p> <p>3. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性</p> <p>4. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>5. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p>	182	580	保留
123	PHENYLEPHRINE, COMBINATIONS (複方: BROMPHENIRAMINE MALEATE + PHENYLEPHRINE HCL)	錠劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	<p>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, Phenylephedrine 是一種類交感神經興奮劑, 偶爾引發暈眩、神經質、燥動、顫抖、呼吸困難、虛弱、臉色蒼白、及過敏反應。雖然在建議劑量下使用少有副作用發生, 長期服用超大劑量會引起肝毒性, 故宜在醫師仔細評估下審慎使用。</p> <p>2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性</p> <p>3. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p>	149	218	保留
124	PIROXICAM	外用凝膠劑	暫時緩解局部疼痛	<p>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, Pseudoephedrine 是一種交感神經興奮劑, 常有下列的副作用: 睡不著或睡眠障礙(最為常見)、手抖或身體發抖、焦慮、頭痛、頭暈、心悸、口乾等。宜經醫師仔細評估下小心使用。</p> <p>2. 台灣外科醫學會:保留, 止痛藥</p> <p>3. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>5. 台灣麻醉醫學會:其他, 表單內用藥都是一般內外科止痛用藥, 並非麻醉用藥, 他們對於這些用藥品沒有意見</p> <p>6. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	9	9	保留
125	POVIDONE-IODINE	栓劑	輕度陰道刺激、搔癢及痔腫之緩解	<p>1. 台灣婦產科醫學會:保留, 臨床確實有需要</p> <p>2. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>4. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	13	69	保留
126	PREDNISOLONE (複方: BISMUTH SUBGALLATE + LIDOCAINE HCL + NITROFURAZONE + PHENYLEPHRINE HCL + PREDNISOLONE)	軟膏劑	內外痔瘡、痔出血、肛門周圍之炎症、肛門潰瘍、肛門裂傷痔瘡藥膏	<p>1. 台灣外科醫學會:保留, 皮膚癌用藥</p> <p>2. 台灣醫學會:未表示意見</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議</p> <p>4. 台灣內科醫學會:未表示意見</p>	32	42	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
127	PSEUDOEPHEDRINE, COMBINATIONS (複方: CARBINOXAMINE MALEATE + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	膜衣錠	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, 這類藥物是便宜且有效的第二代組織胺併用pseudoephedrine, 對於伴隨鼻塞症狀的皮膚過敏患者提供額外的治療效果。建議保留此藥物, 可以減少病患需要其他藥物治療, 有助於提升整體成本效益。 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, Pseudoephedrine是一種交感神經興奮劑, 常有下列的副作用: 睡不著或睡眠障礙(最為常見)、手抖或身體發抖、焦慮、頭痛、頭暈、心悸、口乾等。宜經醫師仔細評估下小心使用。 3. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	535	2569	保留
128	PSEUDOEPHEDRINE, COMBINATIONS (複方: CARBINOXAMINE MALEATE + PSEUDOEPHEDRINE HCL)	錠劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1. 台灣婦產科醫學會:保留, 臨床確實有需要 2. 台灣神經學學會:保留, 無說明理由 3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, Pseudoephedrine是一種交感神經興奮劑, 常有下列的副作用: 睡不著或睡眠障礙(最為常見)、手抖或身體發抖、焦慮、頭痛、頭暈、心悸、口乾等。宜經醫師仔細評估下小心使用。 4. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 5. 台灣外科醫學會:保留, 鼻過敏用藥 6. 台灣醫學會:未表示意見 7. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 8. 台灣內科醫學會:未表示意見	1561	2868	保留
129	RETINOIDS FOR TOPICAL USE IN ACNE (複方: ERGOCALCIFEROL (=VIT D2=CALCIFEROL) + TOCOPHEROL ACETATE ALPHA DL- + VITAMIN A)	乳膏劑	皮膚粘膜乾燥症、皮膚角化症、皮膚炎、濕疹、尋常性痤瘡、外傷及火傷之肉芽新生促進	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, 分類上屬於D10AD, 針對acne治療部分主要有Tretinoin、Adapalene、Isotretinoin、及相關複方。Retinoids用於痤瘡的第一線治療, 也是所有治療指引建議局部治療的首選和基礎用藥, 可以減少發炎、粉刺產生。在輕中度患者, 給付此類藥物可減少患者對更昂貴的藥物治療需求。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	662	3195	保留
130	RETINOIDS FOR TOPICAL USE IN ACNE (複方: ERGOCALCIFEROL (=VIT D2=CALCIFEROL) + TOCOPHEROL ACETATE ALPHA DL- + VITAMIN A)	軟膏劑	一般皮膚乾燥症、皮膚角化症、皮膚炎、尋常性痤瘡、外傷及火傷之肉芽新生促進	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, 分類上屬於D10AD, 針對acne治療部分主要有Tretinoin、Adapalene、Isotretinoin、及相關複方。Retinoids用於痤瘡的第一線治療, 也是所有治療指引建議局部治療的首選和基礎用藥, 可以減少發炎、粉刺產生。在輕中度患者, 給付此類藥物可減少患者對更昂貴的藥物治療需求。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	113	734	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
131	SENNA GLYCOSIDES	錠劑	緩解便秘	1. 中華民國心臟學會:保留,腦中風和心血管疾病患者常用 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	541	3323	保留
132	SILICONES	錠劑	解除脹氣、緩解氣脹相關症狀	1. 台灣消化系醫學會:保留,(1)本藥於胃腸內能藉由降低氣泡之表面張力,而使原來胃腸黏膜上之氣泡因張力改變而破裂,以打嗝或排氣方式將氣體排出體外,解除脹氣、緩解氣脹相關症狀(2)臨床使用量大,安全有效。 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,服用此藥某些患者偶有軟便、胃部不快感、下痢、腹痛、嘔吐、嘔氣等,宜經醫師仔細評估後使用。 3. 臺灣兒科醫學會:保留,為兒童腹部脹氣使用之藥物,但兒童腹脹原因眾多,須由醫師排除潛在疾病,甚或器官腫大之嚴重疾病後,方得使用此一藥物。藥價不高,建議保留 4. 台灣外科醫學會:保留,緩解脹氣用藥 5. 台灣醫學會:未表示意見 6. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 7. 台灣內科醫學會:未表示意見	4949	28386	保留
133	SILYMARIN	膠囊劑	慢性肝病之佐藥	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:其他,臨床使用對於肝功能改善的效果似乎不錯,但是非皮膚科專業能妄下評斷。 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,SILYMARIN若於高劑量或長期使用時,偶有輕瀉或利尿之症狀出現。宜於醫師詳細評估下處方。 3. 臺灣兒科醫學會:保留,為肝功能異常開立之藥物。但應由醫師評估肝功能異常之原因後,方才使用此類藥物。後續也應由醫師追蹤肝功能,確認是否仍需使用此一藥物。藥價不高,建議保留 4. 台灣醫學會:未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	13	18	保留
134	SODIUM CHLORIDE, HYPERTONIC (複方: BENZALKONIUM CHLORIDE + BORIC ACID + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM BORATE DECAHYDRATE (=BORAX) + SODIUM CHLORIDE + SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC (=MONOSODIUM PHOSPHATE))	點眼液劑	眼睛乾澀、洗眼劑	1. 台灣醫學會:未表示意見 2. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 3. 中華民國眼科醫學會:保留,未表示意見 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	749	3578	保留

表1:指示藥品有共識意見明細表(非小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	本署建議保留/刪除/其他
135	SULFUR	洗劑	尋常性痤瘡	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Sulfur 洗劑具有角質溶解和抗菌效果, 適用於痤瘡、脂漏性皮膚炎及酒糟鼻等皮膚問題, 能控制皮脂分泌、去除角質及抑制細菌增生。此洗劑成分天然且成本低, 適合日常使用, 對於輕度皮膚問題提供經濟有效的解決方案, 減少更高昂處方藥的需求。 2. 臺灣兒科醫學會:其他, 請會皮膚科醫學會 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議	12	21	保留
136	TETRACAINE (複方:NITROFURAZONE + PHENYLEPHRINE HCL + TETRACAINE HCL)	軟膏劑	急、慢性內外痔瘡、混合痔、痔出血、單純性直腸炎、肛門裂傷	1. 中華民國大腸直腸外科醫學會:保留, 本學會建議全數保留, 此類藥物皆為直外門診常用藥物, 且需經專科醫師評估過後才能依實際病症開立使用。為維護病患權益及避免病患自行購買不適當的藥物塗抹而延誤病情, 加上栓劑和藥膏皆有其使用之方便性, 故建議此類藥物全數保留。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	94	430	保留
137	TIPEPIDINE	錠劑	鎮咳	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 服用本藥偶有(1)高燒、出疹、持續性頭痛, 及持續達一星期以上的咳嗽, 或有復發情形。(2)消化道: 偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。(3)偶有發疹等過敏症狀。宜經醫師審慎評估下開立使用。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議	1178	3063	保留
138	TRETINOIN	乳膏劑	尋常性痤瘡(面皰)	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Tretinoin 用於痤瘡的第一線治療, 可以減少發炎、粉刺產生。在輕中度患者, 給付此類藥物可減少患者對更昂貴的藥物治療需求。 2. 台灣外科醫學會:保留, 痤瘡藥 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	219	549	保留
139	VITAMIN B12 (=CYANOCOBALAMIN)	點眼液劑	眼睛疲勞	1. 台灣醫學會:未表示意見 2. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 3. 中華民國眼科醫學會:保留, 未表示意見 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	806	4623	保留