

表2:指示藥品有共識意見明細表(小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
1	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + CODEINE PHOSPHATE + METHYLEPHEDRINE DL-HCL + POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE)	糖漿劑	感冒諸症狀 (鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、發熱、頭痛)	台灣醫學會:保留,臨床常用藥物之一	0	0	保留
2	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + AMMONIUM CHLORIDE + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + DEXTROMETHORPHAN HBR + PHENYLEPHRINE HCL + POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE)	糖漿劑	緩解感冒之各種症狀 (咳嗽、喀痰、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、頭痛、發燒、肌肉痛、關節痛)	台灣醫學會:保留,臨床常使用的感冒藥	0	0	保留
3	HYDROCORTISONE (複方:CROTAMITON + HYDROCORTISONE)	軟膏劑	暫時緩解濕疹、尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患的症狀	1. 台灣消化系醫學會:保留,主要作為痔瘡患者緩解症狀使用,痔瘡患者相當多,臨床使用量大,安全有效。建議參酌使用量大之大腸直腸外科醫學會意見。 2. 台灣外科醫學會:保留,防止皮膚搔癢用藥 3. 中華民國大腸直腸外科醫學會:保留,本學會建議全數保留,此類藥物皆為直外門診常用藥物,且需經專科醫師評估過後才能依實際病症開立使用。為維護病患權益及避免病患自行購買不適當的藥物塗抹而延誤病情,加上栓劑和藥膏皆有其使用之方便性,故建議此類藥物全數保留。 4. 台灣醫學會:未表示意見	692	4930	保留
4	MEDICINAL CHARCOAL	顆粒劑	緊急治療藥物或化學品中毒之病人	1. 社團法人台灣急診醫學會:保留,急救用的活性碳單瓶要價不低,且臨床上通常是用於緊急或中毒等專業評估及處置,不建議列為不給付項目 2. 中華民國心臟學會:保留,口服藥物或其他毒物之吸附劑,仍有其角色 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	172	1526	保留

表2:指示藥品有共識意見明細表(小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
5	CARBOCISTEINE	糖漿劑	減少呼吸道黏膜分泌的黏稠性	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, Carbocisteine在肝、心臟患者宜小心使用, 不可使用在胃與十二指腸潰瘍者, 懷孕婦女最好禁止使用, 所以開立只要宜在醫師仔細診斷評估下開立。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議	332	960	保留
6	CROTAMITON	洗劑	溼疹、神經性皮膚炎、蕁麻疹、蚊蟲咬螫、皮膚搔癢症、疥瘡及其他奇生性皮膚感染	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Crotamiton 可當成一種低成本且重要的治療疥瘡藥物, 也可以緩解強烈癢癢和輔助治療疥瘡。其快速止癢效果對於減少過度抓癢造成的皮膚損傷和感染風險十分重要。對於嬰幼兒、孕婦等敏感族群的疥瘡治療是第一線選擇, 在台灣臨床使用有其不可取代的角色, 建議保留此藥物。 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	415	1841	保留
7	HYDROCORTISONE (複方:CROTAMITON + HYDROCORTISONE)	乳膏劑	濕疹、皮膚炎群(包括進行性指掌角皮症、單純性苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎)、皮膚搔癢症、凍傷、乾癬、寄生性蟲體感染(疥瘡)及昆蟲刺傷	1. 社團法人台灣皮膚科醫學會:保留, Hydrocortisone 是低效價的類固醇, 用於輕度皮膚發炎症控制且副作用風險低, 對兒童、敏感部位(例如:臉部、陰部等)及長期使用的患者特別重要。保留給付可減少患者對強效類固醇的需求, 降低潛在的副作用, 減少整體病患自行購買藥物導致醫療風險和增加未來健保相關支出成本。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 5. 台灣內科醫學會:未表示意見	1052	6631	保留
8	PARACETAMOL	內服液劑	退燒、止痛(緩解頭痛、肌肉酸痛、關節痛、神經痛、月經痛、牙痛、咽喉痛)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留, 正確使用acetaminophen可解熱鎮痛, 但長期或過量使用含acetaminophen成分之藥品, 可能導致嚴重肝臟傷害。服用普拿疼且飲酒, 會造成肝臟損傷危險性升高。況且發燒宜找出原因, 不是一味地吃退燒藥退燒, 故宜經醫師確實診斷後開立使用。 2. 臺灣兒科醫學會:保留, 具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他, 無其他相關建議 5. 台灣麻醉醫學會:其他, 表單內用藥都是一般內外科止痛用藥, 並非麻醉用藥, 他們對於這些用藥品沒有意見 6. 台灣內科醫學會:未表示意見	85	131	保留

表2:指示藥品有共識意見明細表(小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
9	PARACETAMOL	咀嚼錠	解熱、鎮痛(頭痛、牙痛、關節痛、神經痛、肌肉痛)之緩解小兒熱	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣醫學會:保留,臨床常用 3. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 4. 台灣內科醫學會:未表示意見	1	1	保留
10	PARACETAMOL	糖漿劑	退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)	1. 社團法人台灣急診醫學會:保留,水劑型的藥物應考量如果不給付且患者不願意自費負擔的低替代性,例如兒童可能無法接受以錠劑藥物磨粉,而一定要使用水劑的Paracetamol退燒 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,正確使用acetaminophen可解熱鎮痛,但長期或過量使用含acetaminophen成分之藥品,可能導致嚴重肝臟傷害。服用普拿疼且飲酒,會造成肝臟損傷危險性升高。況且發燒宜找出原因,不是一味地吃退燒藥退燒,故宜經醫師確實診斷後開立使用。 3. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 4. 台灣醫學會:保留,臨床常用 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣麻醉醫學會:其他,表單內用藥都是一般內外科止痛用藥,並非麻醉用藥,他們對於這些用藥品沒有意見 7. 台灣內科醫學會:未表示意見	2446	13203	保留
11	PSEUDOEPHEDRINE, COMBINATIONS (複方:PSEUDOEPHEDRINE HCL + TRIPROLIDINE HCL)	內服液劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,Pseudoephedrine是一種交感神經興奮劑,常有下列的副作用:睡不著或睡眠障礙(最為常見)、手抖或身體發抖、焦慮、頭痛、頭暈、心悸、口乾等。宜經醫師仔細評估下小心使用。 2. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:未表示意見 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	777	1487	保留
12	PSEUDOEPHEDRINE, COMBINATIONS (複方:PSEUDOEPHEDRINE HCL + TRIPROLIDINE HCL)	糖漿劑	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣醫學會:未表示意見 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	2	2	保留

表2:指示藥品有共識意見明細表(小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
13	OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS (複方:CODEINE PHOSPHATE + DIPHENHYDRAMINE HCL + GUAIACOL GLYCERYL ETHER (=GUAIFENESIN) + METHYLEPHEDRINE DL- HCL)	糖漿劑	鎮咳、祛痰	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,請盡量保留液劑,以讓12歲以下的兒童可以使用。 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀 可減少服用藥物顆數	7	9	保留
14	PLATYCODON	內服液劑	鎮咳、祛痰	1. 社團法人台灣急診醫學會:刪除,無說明理由 2. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留,咳嗽症狀的治療需考量病人整體病情,經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量,以達到緩解症狀並避免潛在副作用,這些藥物非僅是緩解症狀,也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付,單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買,有可能病人症狀未獲緩解,或產生新問題反覆就醫,徒增醫療支出。 3. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 4. 台灣醫學會:未表示意見	216	10387	保留
15	COMBINATIONS (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + GLYCYRRHIZINE EXTRACT + PLATYCODON EXTRACT + POLYGALA EXTRACT)	內服液劑	鎮咳、祛痰 (由支氣管炎、咽喉頭炎所引起之咳嗽及喀痰)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,請盡量保留液劑,以讓12歲以下的兒童可以使用。 2. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	720	3793	保留
16	COMBINATIONS (複方:ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE + GLYCYRRHIZA FLUIDEXTRACT)	液劑	鎮咳、祛痰	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 3. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 4. 台灣內科醫學會:保留,緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物 可為鼻胃管灌食患者使用 5. 台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀 可減少服用藥物顆數	12	17	保留

表2: 指示藥品有共識意見明細表(小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
17	OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS (複方: DEXTROMETHORPHAN HBR + POTASSIUM CRESOLSULFONATE)	糖漿劑	鎮咳、祛痰	<p>1. 社團法人台灣急診醫學會: 刪除, 無說明理由</p> <p>2. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會: 保留(1) 咳痰症狀的治療需考量病人整體病情, 經由醫師評估開立符合個別病患情況的藥物與劑量, 以達到緩解症狀並避免潛在副作用, 這些藥物非僅是緩解症狀, 也有治療疾病的積極作用與必要性。此外病患常會有治療反應的個別性。若刪除這些品項的健保給付, 單讓病人以指示藥物的方式自行決定購買, 有可能病人症狀未獲緩解, 或產生新問題反覆就醫, 徒增醫療支出(2) 對於單獨咳痰症狀的患者, 在診斷病因的同時, 提供合適的症狀控制處方, 不須開立多餘藥物。</p> <p>3. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會: 保留, (1) Opium alkaloid 藥物中常見副作用包括心跳加速、躁動、高血壓、胸痛、顫抖、幻覺、錯覺、迷惑、噁心和嘔吐等, 是屬於管制類用藥, 宜經醫師仔細評估下小心使用(2) 請盡量保留液劑, 以讓12歲以下的兒童可以使用。</p> <p>4. 臺灣兒科醫學會: 保留, 具臨床療效與醫療必要性</p> <p>5. 台灣醫學會: 刪除, 未說明理由</p> <p>6. 台灣家庭醫學醫學會: 其他, 無其他相關建議</p> <p>7. 台灣內科醫學會: 保留, 緩解支氣管炎症狀 慢性阻塞性肺病患者常用藥物</p> <p>8. 台灣內科醫學會: 保留, 緩解感冒症狀 可減少服用藥物顆數</p>	60	714	保留
18	OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS (複方: AMMONIUM CHLORIDE + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + DEXTROMETHORPHAN HBR + METHYLEPHEDRINE DL- HCL + POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE)	糖漿劑	鎮咳、祛痰 (支氣管炎、氣喘所引起之咳嗽、喀痰)	<p>1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會: 保留, 請盡量保留液劑, 以讓12歲以下的兒童可以使用。</p> <p>2. 台灣醫學會: 刪除, 未說明理由</p> <p>3. 台灣家庭醫學醫學會: 其他, 無其他相關建議</p>	2	2	保留

表2:指示藥品有共識意見明細表(小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
19	OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + CODEINE PHOSPHATE + METHYLEPHEDRINE DL-HCL + PLATYCODON EXTRACT + POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE)	糖漿劑	鎮咳、祛痰 (支氣管炎、咽喉炎、感冒引起之咳嗽、喀痰)	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,請盡量保留液劑,以讓12歲以下的兒童可以使用。 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會:保留,此成分同時含有治療鼻水,咳嗽,化痰以及止痛功能的成分,對於較多症狀的病患提供完整處理,在診斷病因的同時,不須開立多樣單方藥物來控制個別症狀,可節省醫療成本。 5. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議 6. 台灣內科醫學會:保留,緩解感冒症狀 可減少服用藥物顆數	220	1860	保留
20	OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS (複方:AMMONIUM CHLORIDE + CAFFEINE ANHYDROUS + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + CODEINE PHOSPHATE + METHYLEPHEDRINE DL-HCL + SENEGA SYRUP)	糖漿劑	鎮咳、祛痰	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,請盡量保留液劑,以讓12歲以下的兒童可以使用。 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	482	849	保留
21	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:ACETAMINOPHEN (=PARACETAMOL) + CHLORPHENIRAMINE MALEATE + GUAIACOL GLYCERYL ETHER (=GUAIFENESIN) + METHYLEPHEDRINE DL-HCL + NOSCAPINE HCL)	糖漿劑	緩解感冒之各種症狀 (咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、咳嗽、喀痰、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)	1. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:刪除,無說明理由。 2. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	0	0	保留
22	OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS (複方:CHLORPHENIRAMINE MALEATE + GUAIACOL GLYCOLATE (=GLYCERYL GUAIACOLATE) + METHYLEPHEDRINE DL-HCL)	糖漿劑	緩解感冒之各種症狀 (流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)	1. 臺灣兒科醫學會:保留,具臨床療效與醫療必要性 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會:保留,請盡量保留液劑,以讓12歲以下的兒童可以使用。 3. 台灣醫學會:刪除,未說明理由 4. 台灣家庭醫學醫學會:其他,無其他相關建議	1004	6927	保留

表2: 指示藥品有共識意見明細表(小兒、急救及公衛需求)

序號	成分	劑型	適應症	學會意見	開立醫療院所數	開立醫師數	保留/刪除/其他
23	GUAIFENESIN	糖漿劑	祛痰	1. 社團法人台灣急診醫學會: 刪除, 無說明理由 2. 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會: 保留, 此藥可能有噁心、嘔吐、頭痛、暈眩等副作用, 宜在醫師仔細評估下小心使用。 3. 臺灣兒科醫學會: 保留, 具臨床療效與醫療必要性 4. 台灣醫學會: 未表示意見 5. 台灣家庭醫學醫學會: 其他, 無其他相關建議	392	3455	保留